



PROTOCOLLO DI PREMEDICAZIONE FARMACOLOGICA CONSIGLIATO PER PAZIENTI ADULTI CON SOSPETTA ALLERGIA A MEZZI DI CONTRASTO

Le indicazioni sottoriportate (dal memorandum della Società Italiana di Allergologia e

Immunologia Clinica) sono relative ai **trattamenti preventivi da effettuarsi prima di esami con mezzo di contrasto**, in soggetti con sospetta ALLERGIA/INTOLLERANZA , su prescrizione del Medico Curante:

FARMACO	POSOLOGIA/DOSAGGIO	TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
DELTACORTENE	2 COMPRESSE DA 25 MG.	13 ORE PRIMA DELL'ESAME
DELTACORTENE	2 COMPRESSE DA 25 MG.	7 ORE PRIMA DELL'ESAME
DELTACORTENE	2 COMPRESSE DA 25 MG.	1 ORA PRIMA DELL'ESAME
TRIMETON **	1 FIALE DA 10 MG.i.m.	1 ORA PRIMA DELL'ESAME

VALUTARE CON IL MEDICO CURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI GASTROPROTETTORI.



**** Verrà iniettato direttamente dal personale del Servizio di Radiologia 1 ora prima dell'esame: è quindi necessario arrivare 1 ora prima dell'esame.**

L'antistaminico (TRIMETON) può procurare sonnolenza e quindi è consigliabile venire accompagnati e non guidare autoveicoli subito dopo l'esame.