

SERVIZIO RADIOLOGIA
SEZIONE DI TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC)
Referente Dott.ssa Muci

**AUTORIZZAZIONE E SCHEMA PER EVENTUALE PREMEDICAZIONE
ALL'ESAME TAC CON MEZZO DI CONTRASTO PER VIA INIETTIVA**

Cognome e Nome :			
Nato/a	il	Peso(Kg)	Statura(cm)
Esame richiesto :			
Indicazioni cliniche :			
Anamnesi positiva per reazioni allergiche o per asma allergico (arrossamento, edema del volto, difficoltà alla deglutizione, edema della glottide, broncospasmo, ...)		SI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al m.d.c. iodato o altre sostanze _____ con le seguenti manifestazioni _____ _____	
Altre Patologie		NO <input type="checkbox"/> Forme di grave insufficienza: epatica <input type="checkbox"/> cardiovascolare <input type="checkbox"/> renale o nefropatia <input type="checkbox"/> (esami biumorali eseguiti entro 30 gg) Se sì: Creatininemia (mg/dl) GFR (Glomerular Filtration Rate)	
		Anemia Falciforme <input type="checkbox"/>	
Data			
			Il Medico Richiedente _____

L'utilizzo di mezzo di contrasto RENDE NECESSARIO IL DIGIUNO DA ALMENO 6 ORE, ad esclusione dei farmaci abitualmente assunti, che possono essere ingeriti con qualche sorso d'acqua. E' inoltre utile consigliare al paziente un'abbondante idratazione prima e dopo l'esame, per accelerare l'eliminazione del mezzo di contrasto per via renale, soprattutto nei casi di insufficienza renale ed epatica.

Mod. Rad.11.1

PROTOCOLLO DI PREMEDICAZIONE FARMACOLOGICA CONSIGLIATO PER PAZIENTI ADULTI CON SOSPETTA ALLERGIA A MEZZI DI CONTRASTO

Le indicazioni sottoriportate* sono relative ai **trattamenti preventivi da effettuarsi prima di esami TAC con mezzo di contrasto iodato**, in soggetti con sospetta ALLERGIA / INTOLLERANZA, su prescrizione del curante :

FARMACO	POSOLOGIA/DOSAGGIO	TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
DELTACORTENE	2 COMPRESSE da 25 mg.	13 ORE PRIMA DELL'ESAME
DELTACORTENE	2 COMPRESSE da 25 mg.	7 ORE PRIMA DELL'ESAME
DELTACORTENE	2 COMPRESSE da 25 mg.	1 ORA PRIMA DELL'ESAME
TRIMETON**	1 FIALE 10 MG I.M.	1 ORA PRIMA DELL'ESAME

Valutare con il MMG eventuale assunzione di gastroprotettori

**** Verrà iniettato direttamente dal personale del Servizio di Radiologia/TAC 1 ora prima dell'esame: è quindi necessario arrivare 1 ora prima dell'esame**

ATTENZIONE: l'antistaminico (TRIMETON) può procurare sonnolenza e quindi è consigliabile venire accompagnati e non guidare autoveicoli subito dopo l'esame

* dal Memorandum della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica

Mod. Rad. 11.1