PREPARAZIONE FARMACOLOGICA ORALE

Prima di indagine radiologica con mezzo di contrasto - scheda per adulti

Da utilizzare esclusivamente se prescritta dal medico/radiologo/allergologo.
La premedicazione riduce ma non elimina il rischio di una nuova reazione.

Schema prescritto

Assumere le dosi ai tempi indicati, calcolati rispetto all'ora fissata per l'esame.

Quando	Farmaco	Dose e via	Data e ora da compilare
13 ore prima	Prednisolone*	50 mg per os	____ / ____ ore ____ : ____
7 ore prima	Prednisolone*	50 mg per os	____ / ____ ore ____ : ____
1 ora prima	Prednisolone*	50 mg per os	____ / ____ ore ____ : ____
1 ora prima	Cetrizina**	10 mg per os	____ / ____ ore ____ : ____

* Lo schema temporale delle linee guida è formulato con prednisone 50 mg; il prednisolone 50 mg va utilizzato soltanto quando espressamente prescritto dal medico. ** L'antistaminico può essere modificato dal prescrittore in base a disponibilità, allergie, terapie concomitanti e protocollo locale.

Indicazioni importanti

Dose dimenticata	Non raddoppiare la dose. Contattare il reparto di Radiologia prima di presentarsi all'esame.
Diabete	Il corticosteroide può aumentare temporaneamente la glicemia: intensificare i controlli secondo indicazione medica.
Sonnolenza	Anche la cetirizina può causare sonnolenza. Non guidare e non usare macchinari se compaiono riduzione dell'attenzione o sedazione.
All'esame	Portare questa scheda, la documentazione della precedente reazione e l'elenco dei farmaci abituali. Segnalare subito al personale qualsiasi sintomo.

ATTENZIONE: una pregressa reazione grave richiede valutazione specialistica, uso di un mezzo alternativo quando possibile ed esecuzione in ambiente attrezzato per il trattamento immediato dell'anafilassi.

Medico prescrittore .....

Faenza, ...

Firma

.....