

Gentilissimo utente,

di seguito tutte le indicazioni necessarie all'esecuzione di **DEFECOGRAFIA**.

La defecografia permette di studiare le fasi della defecazione e di identificare eventuali alterazioni patologiche che compromettono il normale svuotamento dell'ampolla rettale. È quindi indicata in caso di stipsi cronica, di problemi di evacuazione incompleta, di incontinenza, di prolasso rettale, rettocele o di cistocele. In caso di incontinenza offre indizi sulle possibili cause e sull'entità del problema. L'ampolla rettale viene riempita con un mezzo di contrasto contenente bario ad alta densità utilizzando una siringa con cono - catetere. In questo modo viene simulata la consistenza delle feci. Vengono opacizzate anche le anse del piccolo intestino attraverso mezzo di contrasto baritato somministrato per via orale, la vescica mediante mezzo di contrasto iodato posizionando catetere vescicale e/o anche la vagina (nelle donne) per studiare i rapporti reciproci degli organi opacizzati durante la defecazione. Il paziente viene quindi fatto accomodare su un apposito sedile e si procede alla radiografia utilizzando un apparecchio che permette di riprendere i movimenti del retto ed eventualmente degli ulteriori organi cavi precedentemente opacizzati. La ripresa viene effettuata lateralmente. Durante l'esame l'operatore inviterà il paziente a contrarre i muscoli pelvici. L'esame termina con l'espulsione del bario.

il giorno dell'esame presentarsi presso gli sportelli "Casse-Acettazione" con la tessera sanitaria e la richiesta del Medico Curante

PREPARAZIONE

Circa due ore prima è necessario effettuare un clistere di pulizia e presentarsi a digiuno.

Ringraziandola per la fiducia accordataci, Le ricordiamo che per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il CUP al numero

 **0639976496** o inviare una

 mail all'indirizzo cup-scn@gvmnet.it.