



## DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

### DESENSIBILIZZAZIONE IN CASO DI ANAMNESI DI PREGRESSE PATOLOGIE ALLERGICHE

**Ai pazienti che presentino una storia certa o sospetta di reazioni avverse ai mezzi di contrasto iodato** viene suggerito il seguente protocollo di premedicazione, che ha lo scopo di prevenire o limitare le eventuali reazioni.

Il protocollo non presenta effetti collaterali di rilievo, pertanto **si chiede che venga attuato in via prudenziale per i soggetti “a rischio” in occasione di esami diagnostici con mezzo di contrasto.**

#### 48 ORE PRIMA:

- **CETIRIZINA cp 10 mg 1 cp ore 21:00**
- **MEDROL (o analogo) cp 4 mg X 2 (ore 08:00 – ore 15:00)**
- **RANIDIL (o analogo) cp 150 mg X 2 (ore 08:00 – ore 20:00)**

#### 24 ORE PRIMA:

- **CETIRIZINA cp 10 mg 1 cp ore 21:00**

#### GIORNO DELL'ESAME

- **CETIRIZINA cp ½ cp ore 08:00**
- **MEDROL (o analogo) cp 4 mg ore 08:00**
- **RANIDIL (o analogo) cp 150 mg ore 08:00**

*Fonti: Britt.J.Anaesth. Soc.; Anaesthesiology; Anesth. Analg. (anni 1994-98)*

L'uso di Beta – bloccanti e ACE – inibitori andrebbe sospesa prima di sottoporre il paziente a mezzo di contrasto, in quanto determinano una resistenza alla terapia dello shock e dell'asma.

*Il Responsabile Medico  
Dott. Fabio Serafini*