



**SERVIZIO AMBULATORIALE
UROLOGIA
Responsabile dr. Mauro Silvano Minervini**

SCHEMA DI PREPARAZIONE ALLA BIOPSIA PROSTATICA

- Assunzione di antibiotico la sera prima della procedura (preferibilmente chinolonico, per es. LEVOFLOXACINA 500 mg 1 cp die) da proseguire nei 3 giorni successivi la biopsia.
- Clistere evacuativo la sera prima della biopsia.
- Cena leggera la sera prima della biopsia.
- Non necessario il digiuno il giorno della procedura né la sospensione della abituale terapia domiciliare.
- Sospensione della terapia antiaggregante (cardioaspirina, cardirene, ecc...) 7 giorni prima della biopsia solo se assunta a scopo profilattico; se assunta a scopo terapeutico (es. stent coronarici) non necessaria sospensione.
- Sostituzione della terapia anticoagulante orale (Coumadin) con EBPM (es CLEXANE) secondo schema del centro della coagulazione di riferimento – idem per la ripresa della stessa.
- Allegare al momento della biopsia ECG (già refertato) ed esami della coagulazione (PT, PTT e Piastrine).
- Se il paziente è cardiopatico/vasculopatico dovrà allegare inoltre recente visita specialista che ne attesti la stabilità clinica.

**PRESENTARE IL GIORNO DELLA BIOPSIA 2 IMPEGNATIVE DEL MEDICO DI
BASE CON LA DICITURA:**

- 60.11 AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA PROSTATA. Approccio transperineale o transrettale **in quantità 2**
- 91.44.1 ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO GENITALE MASCHILE. Agobiopsia prostatica su prelievi multipli. Incluso: eventuali analisi supplementari istochimiche e/o immunoistochimiche necessarie al completamento della diagnosi. Per singolo lobo trattato, almeno 6 campioni per lobo **in quantità 2**

Mod. Amb. URO 1.0