

**U.O. di UROLOGIA****Responsabile: Prof. A. Calarco**

## SCHEMA DI PREPARAZIONE ALLA BIOPSIA PROSTATICA

- Assunzione di antibiotico Fosfomicina 3gr la sera prima e 12 ore dopo la biopsia
- Si raccomanda una abbondante colazione il giorno della procedura
- Nel caso in cui la procedura venga svolta nel pomeriggio, si raccomanda di pranzare
- Non necessaria la sospensione della abituale terapia domiciliare.
- Sospensione della terapia antiaggregante (cardioaspirina, cardirene, ecc...) 7 giorni prima della biopsia solo se assunta a scopo profilattico; se assunta a scopo terapeutico (es. stent coronarici) non necessaria sospensione.
- Sostituzione della terapia anticoagulante orale (Coumadin) con EBPM (es CLEXANE) secondo schema del centro della coagulazione di riferimento – idem per la ripresa della stessa.
- Recare in visione al momento della biopsia: PT, PTT, INR.
- Se il paziente è cardiopatico/vasculopatico dovrà allegare inoltre recente visita specialista che ne attesti la stabilità clinica.
- Se il paziente è portatore di dispositivo elettronico pacemaker comunicarlo tempestivamente in fase di prenotazione dell'esame
- Si raccomanda di venire accompagnati